

**Przykładowe pytania testowe**, na które powinien umieć odpowiedzieć student VI roku po zajęciach z onkologii (prawidłowe odpowiedzi jak i elementy sugerujące prawidłową odpowiedź zaznaczono):

1. W przypadku podejrzenia raka piersi w badaniu klinicznym „negatywny mammogram” jest gwarancją nieobecności nowotworu:
  - a. prawda
  - b. fałsz**
2. Lite, niebolesne powiększenie węzła chłonnego szyi, u pacjenta powyżej 40 roku życia, bez klinicznych objawów guza pierwotnego powinno budzić podejrzenie:
  - a. miejscowego stanu zapalnego
  - b. torbieli oskrzelopochodnej
  - c. gruźlicy
  - d. nowotworu złośliwego**
  - e. niezłośliwego guza nowotworowego
3. Najlepszy sposób wykrycia **wczesnego** (bezobjawowego) raka prostaty to:
  - a. biopsja stercza
  - b. oznaczenie PSA
  - c. oznaczenie PSA i kwaśnej fosfatazy sterczowej**
  - d. badanie per rectum
  - e. ultrasonografia stercza
4. Rak przedinwazyjny (carcinoma in situ) nie powoduje przerzutów i w związku z tym ma dobre rokowanie:
  - a. prawda**
  - b. fałsz
5. **Dziedziczny** rak piersi jest skojarzony z:
  - a. rakiem okrężnicy
  - b. rakiem jajnika**
  - c. rakiem endometrium
  - d. rakiem skóry
6. Poprawa przeżycia w raku piersi jest powodowana **głównie**:
  - a. wczesnym wykrywaniem**
  - b. radykalnym leczeniem operacyjnym
7. Chirurgia nowotworów może mieć charakter:
  - a. radykalny
  - b. diagnostyczny
  - c. paliatywny
  - d. cytoredukcyjny
  - e. każdy z wymienionych**
8. Węzeł wartowniczy to:
  - a. pierwszy węzeł chłonny w dorzeczu regionalnych węzłów chłonnych**
  - b. węzeł chłonny zawierający mikroprzerzuty

9. Najbardziej korzystne rokowanie ma raka tarczycy:

- a. **brodawkowaty**
- b. pęcherzykowy
- c. anaplastyczny
- d. rdzeniasty

10. Zwiększenie wydajności badań przesiewowych i zmniejszenie kosztów jest możliwe dzięki:

- a. ograniczeniu badań do populacji cechującej się wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór
- b. objęcie badaniem całej populacji
- c. wykorzystywanie do badań nie tylko lekarzy, ale także średniego personelu medycznego
- d. stosowanie testów wystarczająco swoistych
- e. **prawdziwe a, c, d**

11. System TNM:

- a. służy do oceny stopnia zaawansowania nowotworu **tak/nie**
- b. uwzględnia specyfikę każdego narządu **tak/nie**
- c. jest podstawą zaplanowania leczenia **tak/nie**
- d. służy do oceny rokowania **tak/nie**

12. **Przeciwwskazaniem** do leczenia raka piersi z zachowaniem gruczołu piersiowego (breast conserving therapy) jest:

- a. rak piersi u mężczyzn
- b. rak zapalny (carcinoma inflammatorium)
- c. brak radioterapii na wysokim poziomie
- d. rozlany rak przewodowy in situ
- e. **każde z powyższych**

13. W profilaktyce **wtórnej** raka piersi największe zastosowanie ma:

- a. zaniechanie palenia tytoniu
- b. samokontrola piersi
- c. dieta odchudzająca
- d. **badanie mammograficzne**
- e. kontrolne badanie palpacyjne przez ginekologa

14. **Bezwzględne** przeciwwskazanie do leczenia operacyjnego raka płuca stanowi:

- a. naciekanie ściany klatki piersiowej
- b. przebyty zawał serca
- c. przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia po stronie guza pierwotnego
- d. PaO<sub>2</sub> poniżej 70 mmHg
- e. **zespół żyły głównej dolnej**

15. Wartość skriningu w postaci obniżenia umieralności grupy badanej **udowodniono** dla raka:

- a. żołądka
- b. jelita grubego
- c. **gruczołu piersiowego**
- d. wątroby
- e. stercza

17. Miejsce **najczęstszej** lokalizacji raków skóry stanowi:
- tułów
  - dłonie i stopy
  - głowa**
  - okolica odbytu
  - szyja
18. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w czerniaku jest:
- pleć chorego
  - wiek pacjenta
  - głębokość nacieku**
  - barwa guza
  - owłosienie zmiany
19. Znamię skórne średnicy 0,5 cm o niejasnym charakterze najlepiej:
- wyciąć w całości**
  - starannie obserwować
  - pobrać z niego wycinek
  - zamrozić
  - skoagulować
20. **Najistotniejszym** warunkiem stwarzającym szansę wyleczenia mięsaków tkanek miękkich jest:
- wycięcie z szerokim marginesem zdrowych tkanek**
  - wycięcie skojarzone z napromienianiem
  - wycięcie skojarzone z radioterapią
  - chemioterapia indukcyjna + napromieniowanie + wycięcie
  - amputacja kończyny
21. Wskaż prawidłową odpowiedź:
- Przeciwwskazaniem** do rekonstrukcji piersi po mastektomii jest:
- stwierdzenie złych czynników rokowniczych
  - niewystarczająca motywacja psychologiczna**
  - pooperacyjna radioterapia
  - uzupełniające leczenie systemowe
  - żadne z powyższych
22. Jaki procent raków gruczołu piersiowego nie zostaje wykryty podczas **rutynowych** mammografii:
- 5-10%
  - 10-15%**
  - 25%
  - 25-35%
  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
23. **Najbardziej** przydatne w raku jelita grubego jest oznaczanie:
- HCG
  - CA 15.3
  - CEA**
  - CA 19-9
  - CA 125

24. Zgodnie z Konwencją Helsińską i Zasadami Etyki Lekarskiej chorzy na nowotwór

- a. **powinni być poinformowani o rozpoznaniu**
- b. nie powinni być informowani o rozpoznaniu
- c. powinni być informowani o rozpoznaniu zależnie od woli najbliższej rodziny
- d. powinno się informować o rozpoznaniu tylko najbliższą rodzinę
- e. powinno się pozostawić informowanie chorego rodzinie

25. Ponad 50% raków jelita grubego rozwija się w:

- a. okrężnicy wstępującej
- b. okrężnicy poprzecznej
- c. **odbytnicy**
- d. okrężnicy wstępującej
- f. esicy

26. Mięsaki tkanek miękkich w 90% dają przerzuty do:

- A. wątroby
- B. kości
- C. **płuc**
- D. mózgu
- E. okolicznych węzłów chłonnych